PRIMAPE

Scheda tecnica — Nutrizione per api

primape.it

Sciroppo Apiinvert

Sciroppo invertito liquido pronto all'uso

Cos'è

Apiinvert è uno sciroppo invertito liquido pronto all'uso, ottenuto solo da zuccheri di barbabietola (niente frumento o mais). Il suo profilo di zuccheri è simile a quello del miele di fiori; gli zuccheri sono tutti utilizzabili dall'ape e il prodotto è microbiologicamente stabile. Si versa direttamente nel nutritore, senza preparazione.

Composizione

Parametro	Valore
Sostanza secca	72,7%
Fruttosio (sulla sostanza secca)	39%
Glucosio (sulla sostanza secca)	31%
Saccarosio (sulla sostanza secca)	30%
HMF	10-20 ppm alla produzione
Origine	Zucchero di barbabietola, prodotto in Europa

Quando usarlo

- Scorte invernali: agosto-settembre, dopo l'ultimo raccolto.
- Stimolo primaverile: marzo-aprile.
- Nuclei e sciami: maggio-luglio, e periodi senza nettare.
- Con temperature sopra i 10-12 °C, finché le api lo prelevano dal nutritore.

Dosi indicative e somministrazione

- Nel nutritore (a tasca, rotondo o a depressione) a porzioni di 2-3 kg.
- Scorte: indicativamente 8-14 kg per famiglia in totale (1 kg di sciroppo corrisponde a circa 0,7-0,8 kg di scorte).
- Stimolo: indicativamente 0,5-1 kg a settimana, anche diluito con il 20-30% di acqua.
- Il secchiello da 14 kg con nutritore a depressione si capovolge sul foro del coprifavo.
- Le buste da 2,5 kg si possono anche appoggiare sui favi praticando piccoli tagli.

Formati disponibili

Formato	Peso netto	Kg per pallet
Cartone da 5 buste da 2,5 kg	12,5 kg	800 kg
Secchiello da 14 kg con nutritore a depressione	14 kg	616 kg
Bag-in-Box da 16 kg con rubinetto	16 kg	768 kg
Bag-in-Box da 28 kg con rubinetto	28 kg	1.008 kg
Cisterna a perdere (per professionisti, bancale dedicato)	1.300 kg	1.300 kg

Conservazione

- 18 mesi in confezione originale chiusa, a 10-25 °C.
- Una volta aperto, consumare entro circa 2 mesi.
- Se cristallizza al freddo, scaldare dolcemente a bagnomaria (max 35-40 °C).

PRIMAPE

Scheda tecnica — Nutrizione per api

primape.it

Avvertenze

- Le dosi indicate sono indicative: adattarle a forza della famiglia, stagione e scorte presenti.
- Non somministrare sciroppo con temperature sotto i 10-12 °C: le api non lo prelevano.
- Non scaldare lo sciroppo oltre 35-40 °C e non farlo bollire.
- Tenere lontano da formiche e vespe; evitare di versarlo fuori dal nutritore per non innescare saccheggio.
- Aprire la confezione solo al momento dell'uso.